

+
CHLORIVAG®

KADEFARM

*kwasy hialuronowy, bromelaina,
dichlorowodorek chlorheksydyny,
witamina E*

Globulki dopochwowe, 10 sztuk


DZIAŁANIE PRZECIWZAPALNE

Wspomaga produkcję śluzu i utrzymuje prawidłowe nawilżenie błon śluzowych.

Przyspiesza gojenie i regenerację mikrourazów nabłonka pochwy.

Zapobiega nawracającym infekcjom bakteryjnym błon śluzowych.

Utrzymuje prawidłowe środowisko pochwy.





CHLORIVAG®

KADEFARM

*kwasy hialuronowy, bromelaina,
dichlorowodorek chlorheksydyny,
witamina E*

Globulki dopochwowe, 10 sztuk

DZIAŁA PRZECIWZAPALNIE I ZAPOBIEGA INFEKCIOM, PRZYSPIESZA GOJENIE USZKODZEŃ NABŁONKA.

Chlorivag® zalecany jest do długotrwałego stosowania profilaktycznego u pacjentek po leczeniu przeciwzapalnym, ze skłonnością do częstych infekcji (spowodowanych także przez aktywność sportową, pływanie w basenie, częste kąpiele w wannie), w okresie menopauzy i przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Chlorivag® działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach o charakterze zapalnym, infekcyjnym oraz z nieprawidłowymi zmianami w nabłonku pochwy. Przeciwdziała nawrotom stanów zapalnych śluzówki pochwy. Stabilizuje wydzielanie śluzu, wspomagając tym samym odbudowę i utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Rekomendowany w przypadku zaczerwienienia, świądu, pieczenia i podrażnienia, spowodowanych różnymi typami chorób dróg rodnych o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Stosowany jako terapia wspomagająca przed i po ginekologicznych zabiegach chirurgicznych.

DAWKOWANIE:

Pacjentki po leczeniu przeciwzapalnym: 2 razy dziennie 1 globulka, przez dwa dni; następnie 1 globulka co drugi dzień, przez około dwa tygodnie.

Pacjentki ze skłonnością do częstych infekcji, w okresie menopauzy, stosujące antykoncepcję hormonalną: dwa razy w tygodniu 1 globulka.

W terapii przewlekłej, powyżej 1,5 miesiąca, utrzymywać dawkowanie dwa lub trzy razy w tygodniu 1 globulkę.