



MEDIVAG

KADEFARM

*Lactobacillus acidophilus,
acidum lacticum*
Kapsułki dopochwowe 6 sztuk

6

TYLKO 6 APLIKACJI!

NA KOBIECE PROBLEMY NAJKRÓTSZA SKUTECZNA KURACJA

W LECZENIU DOLEGLIWOŚCI INTYMNYCH POCHWY:

- Do stosowania w przypadku świądu, pieczenia, uczucia suchości, podrażnień oraz nadmiernej ilości wydzieliny (upławy), często z nieprzyjemnym zapachem.
- W przypadku stwierdzonych infekcji bakteryjnych i grzybiczych.
- Odtwarza i stabilizuje prawidłową florę bakteryjną nabłonka pochwy.
- Zapobiega nawrotom infekcji.
- Normalizuje poziom kwasowości pochwy.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

Kapsułki Medivag® sprzyjają przywróceniu naturalnego stanu fizjologicznego pochwy. Zawierają probiotyczne bakterie kwasu mlekowego *Lactobacillus acidophilus*, normalnie obecne we florze pochwy, a także kombinację składników aktywnych (kwas mlekowy, żurawina), które pozwalają kontrolować stały poziom kwasowości.

Kapsułki w otoczce roślinnej, nie zawierają żelatyny pochodzenia zwierzęcego.





MEDIVAG

KADEFARM

Lactobacillus acidophilus,
acidum lacticum
Kapsułki dopochwowe 6 sztuk

NAJKRÓTSZA SKUTECZNA KURACJA

Większość dolegliwości intymnych spowodowana jest zaburzeniem środowiska pochwy. W pochwie w warunkach prawidłowych obecna jest ogromna liczba bakterii, nazywanych mikroflorą lub środowiskiem pochwy. Odpowiadają one za jej kwasowe środowisko (pH). Zmiana poziomu kwasowości, nawet krótkotrwała, może spowodować zaburzenia w obrębie mikroflory pochwy. Jeżeli bakterie kwasu mlekowego zostaną zdominowane przez szkodliwe, inne mikroorganizmy (bakterie lub grzyby), mogą wystąpić różne dolegliwości intymne, a w dalszej konsekwencji stan zapalny.

BAKTERYJNE ZAPALENIE POCHWY: Bakteryjne zapalenie pochwy to stan zaburzenia flory bakteryjnej spowodowany szkodliwymi bakteriami. Można je rozpoznać obserwując zmianę wydzieliny. Wydzielina może być bezbarwna lub zabarwiona, jej ilość może być nadmierna, często o nieprzyjemnym zapachu ryby. Często towarzyszą temu takie dolegliwości jak: świąd, podrażnienie, nadwrażliwość, zaczerwienienie i suchość.

ZAKAŻENIA CANDIDA (ZAKAŻENIA GRZYBICZE): Kandydoza jest infekcją grzybiczą spowodowaną przez drożdżopodobne grzyby, głównie *Candida albicans*. Zakażenie pochwy przez *Candida* objawia się świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem i zwykle białą wydzieliną.

SPOSÓB UŻYCIA: Medivag® stosuje się przez 6 dni, jeden raz dziennie, przed snem.

Podczas profilaktyki nawracających infekcji, przy powracających stanach suchości śluzówki pochwy, przy przewlekłych dolegliwościach intymnych, Medivag® stosuje się co drugi dzień, przed snem, przez 12 dni, a następnie 2 razy w tygodniu, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości.



STOSOWANIE PODCZAS CIĄŻY I/LUB KARMIENTA: należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu.

Medivag® dostępny jest w aptekach, bez recepty.

Wytwórca: PK Benelux BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Dystrybutor w Polsce: Kadefarm Sp. z o.o. Sierosław ul. Gipsowa 18, 62-080 Tarnowo Podgórne, www.kadefarm.pl

KADEFARM
www.kadefarm.pl